

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (kihajtható leporelló a flakonra ragasztva)
FIPROMAX 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray kutyák és macskák részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Fortevit Kft.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Kft.

1108 Budapest, Gumigyár u 5-7

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FIPROMAX 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray kutyák és macskák részére A.U.V.

Fipronil

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

100 ml oldat tartalmaz:

Hatóanyag:

Fipronil: 0,25 g

Segédanyagok:

Butil-hidroxitoluol (E321)

Butil-hidroxianizol (E320)

4. JAVALLAT(OK)

Kutyák és macskák bolhák (*Ctenocephalides* spp.) és kullancsok (*Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) okozta fertőzőtségeinek gyógykezelésére és megelőzésére, valamint a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) kezelési stratégiájának részeként. A készítmény kutyákon és macskákon kullancs ellen 35 napig, kutyákon bolhák ellen 91 napig, macskákon bolhák ellen 60 napig véd, függően a környezet fertőzőtségétől.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható 2 naposnál fiatalabb kutya- és macskakölykökön.

Nem alkalmazható beteg (szisztémás betegségben szenvedő, lázas) ill. lábadozó állatoknál.

Nem alkalmazható nyulakon, mert súlyos mellékhatásokat és elhullást is okozhat.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ha a készítményt az állat lenyalja, rövid ideig nyálzást figyelhetünk meg, ami leginkább a vivőanyag természetéből adódik. Nagyon ritkán nyálzás, átmeneti idegrendszeri tünetek (hiperesztézia, depresszió), a szem irritációjából adódó tünetek, viszketés, szőrhullás, hányás és légzőszervi tünetek fordulhatnak elő. A termék túladagolása kerülendő.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kutya, macska

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Alkalmazás módja: Külsőleges alkalmazás

Adagolás:

Az ajánlott dózis 3 – 6 ml FIPROMAX/ttkg (7,5 – 15 mg fipronil/ttkg), ami 10-20 pumpálást jelent a 100 ml-es, illetve 1-2 pumpálást a 250 ml-es és az 500 ml-es flakonból testtömeg kilogrammonként.

A készítmény kutyákon és macskákon kullancs ellen 35 napig, kutyákon bolhák ellen 91 napig, macskákon bolhák ellen 60 napig véd, függően a környezet fertőzőtségétől.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Alkalmazási útmutató

Permetezzük a készítményt az állat szőrére az egész testfelületen kb. 10-20 cm távolságból a szőr növekedésével ellentétes irányban, hogy a szőr teljesen átnedvesedjen egészen a bőrig. A hosszúszőrű állat szőrét borzoljuk fel, hogy a készítmény eljusson a bőrre az állat hátán, oldalán, hasán, lábain, vállán és nyakán is.

A fej és környékének kezelésekor permetezzük a készítményt a gumikesztyűs kezünkbe és dörzsöljük be finoman a szőrbe. Hagyjuk megszáradni az állatot letörlés nélkül.

A termék bevonatképző anyagot is tartalmaz, ami a bundán filmréteget képez és a szőrt fényessé teszi.

Vizsgálatok hiányában a két kezelés közötti javasolt minimális idő 4 hét.

El kell kerülni, hogy a készítmény az állat szemébe vagy szájába jusson.

Fontos a pontos adagolás betartása.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on, fénytől védve tartandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A tartály első felbontása után felhasználható: 12 hónapig.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Az ajánlott adagot nem szabad túllépni. El kell kerülni, hogy a készítmény az állat szemébe jusson. Véletlen szembe kerülés esetén a szemet azonnal és alaposan tiszta vízzel ki kell öblíteni. Közvetlenül sérült bőrfelületre nem permetezhető.

A kezelt állatokat hagyni kell jól szellőző helyiségben megszáradni.

Az állatokat zárt helyiségbe vagy hordozóba zárni, amíg azok szőrzete teljesen meg nem száradt, nem szabad.

Megfelelő tolerancia- és hatékonyság vizsgálatok hiányában a készítmény macskákon és kutyákon kívül más állatfajok kezelésére nem javasolt. Az optimális hatékonyság érdekében az állatok fürdetése vagy samponozása a kezelést megelőző, illetve a kezelést követő két napos időszakban nem ajánlott.

A bolhafertőzőttség elleni hatékony védelem érdekében több állatot tartó háztartásokban a háztartásban élő minden kutyát és macskát egy időben kell kezelni. A kutya és macska bolhák gyakran telepednek meg az állat kosarában, alvóhelyén, rendszeres pihenőhelyén, például a szőnyegben vagy kárpitozott bútorokban. Súlyos bolhafertőzőttség esetén a bolhairtás megkezdésekor megfelelő inszekticid szerrel való kezelés, illetve rendszeres porszívózás szükséges. A készítmény nem alkalmas a környezet közvetlen kezelésére.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Gondoskodni kell róla, hogy az állatok egymást vagy magukat ne tudják nyalogatni a kezelés után.

Egy-egy kullancs megtelepedhet az állaton, ezért a fertőző betegségek átvitelét nem lehet teljesen kizárni.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A készítmény alkalmazása során gumikesztyű viselése javasolt.

A készítmény nyálkahártya és szem irritációt okozhat, ezért el kell kerülni, hogy szembe vagy szájba jusson. Az alkalmazó, ill. az állat ektoparazitikumokkal vagy alkohollal szembeni ismert túlérzékenysége esetén kerülni kell az érintkezést a FIPROMAX 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray készítménnyel.

El kell kerülni, hogy a készítmény a bőrre jusson. Ha ez mégis megtörténik, szappannal és vízzel alaposan kezni kell mosni.

Ha véletlenül szembe kerül a termék, akkor tiszta vízzel alaposan ki kell mosni.

A készítmény használata után kezni kell mosni.

Amíg az alkalmazás helye szárazzá nem válik, addig a kezelt állatokat nem szabad simogatni és a gyerekeket nem szabad engedni játszani velük. Ezért javasolt az állatokat kora este kezelni, és a kezelt állatok nem aludhatnak együtt a gazdával, különösen nem gyerekekkel.

A kezelés alatt nem szabad dohányozni, enni és inni.

Egyéb óvintézkedések

A fipronil ártalmas lehet a vízi szervezetekre.

A kezelt kutyát a kezelés után két napig nem szabad természetes vizekben úsztatni.

Vemhesség, laktáció:

A vemhesség és laktáció ideje alatt alkalmazható.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Nem állnak adatok rendelkezésre.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Kutyákon és macskákon az ajánlott dózis ötszörösével végzett kezelés során sem állapítottak meg nemkívánatos hatást. A nemkívánatos hatások megjelenésének kockázata mindazonáltal növekedhet túladagoláskor, ezért az állatokat mindig a testtömegének megfelelően és az előírt adagolás pontos betartásával kell kezelni.

Inkompatibilitások:

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A FIPROMAX 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre. El kell kerülni, hogy a készítmény vagy a kiürült csomagolóanyag élővizekbe jusson.

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. június 12.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

100, 250 és 500 ml-es adagolópumpával ellátott műanyag flakon.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.